

ПОЛИОМИЕЛИТ

Это острая вирусная инфекция- характеризующаяся поражением слизистой оболочки кишечника и носоглотки и повреждением двигательных клеток передних рогов спинного мозга и других отделов ЦНС с развитием вялых атрофических параличей и парезов мышц.

Источник инфекции - больной или носитель ,вирус выделяется из носоглотки до **5** дней с начала заболевания, а из испражнений - от нескольких недель до **3-4** месяцев.

Механизм передачи - фекально-оральный, возможен аэрозольный (в продромальном периоде)

Пути передачи -пищевой (чаще молоко, овощи, фрукты, ягоды).

Водный - редко **Бытовой** – грязные руки, предметы обихода.

Воздушно-капельный - заражение возможно в первые дни болезни,восприимчивость невысокая.



В России в 2010 г. при заносе из Таджикистана были выявлены 14 случаев полиомиелита, вызванного диким вирусом 1-го типа.

Прививки от полиомиелита детям начинают с возраста: **3-х** месяцев трехкратно с интервалом **6** недель **инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ)**. График повторных прививок от полиомиелита детям— в 18 и 20 месяцев, а также в 14 лет — оральной полиомиелитной вакциной (ОПВ).



Отказываться от этой прививки не стоит, поскольку полиомиелит является опасным заболеванием, которое может сделать ребенка инвалидом.